

Nombre del dueño _____ Nombre de la mascota _____

Número de la mascota _____

SpayNeuterNac

Cuidado del animal después de la cirugía

1) Las suturas de su mascota son:

_____ internas, y la superficie de la piel se ha cerrado con adhesivo quirúrgico estéril; por lo tanto, no hace falta quitar ninguna sutura

_____ externas, y deben de ser quitadas por su veterinario entre los 7 y los catorce días después de la cirugía. Si Ud. no tiene un veterinario, puede llamar a nuestra técnica para quitarlas: 560-5011.

2) Hemos despachado los medicamentos siguientes (las instrucciones están en la etiqueta)

Medicamento	Propósito

Si a Ud. le gustaría tener a mano analgésicos en caso de que su mascota experimente dolor después de la cirugía, los puede obtener gratis cuando recoja a su mascota.

3) Resultados de las pruebas:

Flotación fecal: negativa uncinarias nematodos coccidias solitarias

Parásitos del corazón: negativo positivo

Leucemia felina: negativo positivo

4) Hemos identificado los siguientes problemas que deben ser atendidos por su veterinario:

Esta noche:

5) Es posible que su mascota no tenga ganas de comer o tomar agua la primera noche después de la cirugía. Ofrezcale comida y agua, pero permita que la mascota decida si quiere comer/beber o no.

6) Falta de apetito, vómitos y pereza son normales después de la anestesia. Sin embargo, si los síntomas persisten por más de 24 horas, llámenos al 560-5011 para obtener instrucciones.

Mañana y pasado mañana:

7) Algunas mascotas tendrán una tos leve después de la cirugía a causa del tubo colocado durante la operación para ayudarles a respirar bajo anestesia. Si la tos es severa o acompañada de otros síntomas de enfermedad (falta de apetito, pereza extrema, mocos, etc.), llámenos.

8) Mantenga a su mascota en un lugar caliente, seco y tranquilo, alejado de otros animales y de niños pequeños por un mínimo de 48 horas.

9) Aunque a la mayoría de las mascotas no les molesta la incisión, algunos la querrán morder o lamer. No permita que su mascota lo haga. A veces la mascota dejará de hacerlo si se le aplica algo de sabor amargo cerca de la incisión. Si su mascota se empeña en lamer o morder, hay collares especiales (collar isabelino) que pueden ser útiles. Ud. puede conseguir un collar en la clínica gratis; o se venden en tiendas que tienen productos para animales.

10) Los perros machos maduros tienen una incidencia mayor de complicaciones pos-quirúrgicas después de ser castrados:

1) morder y lamer: 20% de los machos castrados se empeñan en morder o lamer la incisión. Si a su mascota le hace falta un collar isabelino, pase por la clínica con la mascota para que le pongamos uno del tamaño apropiado, y le enseñaremos a Ud. a ponérselo y a quitárselo.

2) hinchazón y moretones: en casi la mitad de los machos maduros se notará un poco de hinchazón y piel descolorida. Es de esperar y normalmente se resolverá en unos pocos días.

3) sangrado dentro del escroto (hematoma): cerca del 10% de los machos maduros sangrarán dentro del escroto después de la cirugía.

Raras veces, el escroto se verá más grande que antes de la cirugía. Si ocurre un hinchazón significativa, es importante que veamos al perro cuanto antes. Le podemos colocar una venda para controlar el sangrado si se hace a tiempo.

Si Ud. no puede venir a la clínica, debe saber que, aunque la condición le da una apariencia rara al perro y es un poco incómodo para el animal, el proceso

normalmente se frena entre los tres y los diez días. Presión del líquido causa que los capilares se cuelen, y el cuerpo eventualmente absorberá el líquido.

11) compresas calientes: si Ud. nota hinchazones, moretones, o si su mascota parece sufrir, la aplicación de compresas calientes puede disminuir la hinchazón y acelerar su recuperación. Ud. puede empapar una toalla con agua caliente, estrujarla, y tenerla contra el área por cinco o diez minutos. Se puede hacer de dos a cuatro veces al día, como sea necesario.

Esta semana:

12) Trate de impedir que su mascota corra, salte, o juegue duro por una semana. Nada de giros, jugar al Frisbee, resbalarse por el piso; ni perseguir gatos, ardillas, perros ni otros animales. Que ni se le ocurra hacerlo.

13) Mire la incisión todos los días. Un nudo o piel rojiza es normal. Al contrario, si le sale sangre o pus, o si la incisión se abre, llámenos. Si un perro macho experimenta hinchazón excesiva, llámenos en seguida.

14) Ud. no debe de bañar a su mascota, ni permitir que su mascota nade ni juegue en el agua ni en el lodo por siete días.

Los próximos 30 días:

15) Las hormonas de los perros y los gatos maduros permanecen en sus sistemas por dos o tres semanas después de castrarse; por lo tanto, los cambios de comportamiento serán lentos: es decir que los machos pueden seguir buscando a hembras por cierto tiempo. En algunos casos, raros, seguirán buscando hembras por el resto de su vida. Hay hábitos difíciles de romper.

16) El flujo vaginal de las hembras esterilizadas cuando están en celo puede continuar por dos semanas después de la cirugía. Esto quiere decir que, si su mascota fue operada cuando estaba en celo, es posible que siga atrayendo a los machos por dos o tres semanas después de la operación. No permita que los machos tengan acceso a ella, porque al montarla pueden desgarrar las suturas internas, causando una hemorragia interna y hasta la muerte.